

LENGVINA EGZEMOS SIMPTOMUS

DUCRAY
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES

DEXYANE MeD

Medicinos priemonė, atopinio, kontaktinio bei lėtinio dermatito simptomams lengvinti

Veidui,
kūnui,
rankoms



Padidina vietinių kortikosteroidų veiksmingumą

Akivaizdus pagerėjimas po 3 dienų*

esant vidutiniams ir sunkiems pažeidimams.*

* Klinikinis tinkamumo odai ir veiksmingumo tyrimas atliktas derinant su vidutinio stiprumo vietiniais kortikosteroidais ir baigus naudoti priemonę. Metodologija: atsitiktinių imčių atviras, intraindividualus pranašumo tyrimas; dalyvavo 54 suaugusieji. (RV4421A2013147, 2016-03-04, 91–92, 182–183).

Medicininė priemonė. Atidžiai perskaitykite informacinį lapelį. Netinka besilaukiančioms ir žindančioms moterims. Netepti ant gleivinės arba kūdikiams sauskelnų dėvėjimo srityje. Vengti patekimo į akis. Tinka naudoti nuo 3 mėnesių amžiaus.


Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique

DEXYANE MeD



RAMINAMASIS IR ATKURIAMASIS KREMAS

Veidui, kūnui ir rankoms

YPATYBĖS

- **Lengvina** egzemos simptomus⁽¹⁾
- **Patvirtintas tinkamumas** uždegimo paveiktai odai^(3a)

ĮRODYTAS VEIKSMINGUMAS

Pastebimas pagerėjimas po 3 dienų^(2a)

NAUDOJANT KARTU
Padidina vietinių kortikosteroidų veiksmingumą^(2a)

-83 % atkryčio tikimybė iki 15 dienų^(2b)

PALAIKOMAJAM GYDYMUI
Apriboja pakartotinį pažeidimų atsiradimą⁽¹⁾

-73 % mažesnis skausmas po 8 dienų^(3d)

BŪDINGAS RAMINAMASIS POVEIKIS
Veiksmingas esant lengvų ar vidutinių pažeidimų⁽³⁾

-79,4 % bakterijų sukibimo slopinimas⁽⁴⁾

TVARSČIO EFEKTAS
Riboja bakterijų sukibimą (įrodyta *ex-vivo*)⁽⁴⁾

SUDĖTIS

- **Polisacharidų tinklelis**
- **Drėkinamoji ir maitinamoji bazė 51%**
- **Enoksolonas**

Įšnašas 1, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 3d ir 4 žr. 6 puslapyje

Veidui,
kūnui,
rankoms



30 ml ir
100 ml

Vieną arba du kartus per dieną tepkite tiesiai ant egzemos pažeistos odos.⁽¹⁾

PAPILDOMA PRIEŽIŪROS PROGRAMA

LABAI SAUSAI, ATOPIŠKAI ODAI

DEXYANE

ITIN SODRUS VALOMASIS GELIS

Veidui, kūnui ir plaukams



NUO 3
MĖNESIŲ

- Švelniai **VALO**
- **RAMINA** sudirgusią odą

-57 %
mažesnis
išsausėjimas⁽¹⁾

-67 %
niežėjimo
pojūtis⁽²⁾

**ITIN GERAI
TOLERUOJAMA
SUDĖTIS
Fiziologinis pH**

Tinka naudoti kasdien

400 ml



DEXYANE

NIEŽULĮ SLOPINANTIS
MINKŠTINAMASIS

KREMAS

- Padeda **ATKURTI** odos barjerą
- Stipriai **MAITINA**
- **SLOPINA** niežulį*

35 %
drėkinamoji
ir maitinamoji
bazė

**BE KVAPIJŲJŲ
MEDŽIAGŲ
BE PARABENŲ**

**Vieną arba du kartus
per dieną,
išskyrus uždegimo paveiktą odą**

200 ml



Klinikiniame tyrime dalyvavo 46 asmenys (kūdikiai, vaikai ir suaugusieji). Priemonė buvo naudojama kartą per dieną 4 savaites.

(1) Dermatologo įvertintas sausumo lygio sumažėjimas tarp suaugusiųjų.

(2) Tėvų įvertintas niežėjimo lygio sumažėjimas tarp vaikų ir kūdikių.

* Kurį sukelia odos sausumas.

„DEXYANE MeD“ SUDĖTIS: WATER (AQUA). GLYCERIN. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. BUTYLENE GLYCOL. POLYSORBATE 60. BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER). PROPYLENE GLYCOL. BEESWAX (CERA ALBA). GLYCERYL STEARATE. PEG-100 STEARATE. 10-HYDROXYDECENOIC ACID. CAPRYLYL GLYCOL. CETYL ALCOHOL. CITRIC ACID. DISODIUM EDTA. GLYCYRRHETINIC ACID. GUANIDINE CARBONATE. POLYACRYLATE-13. POLYISOBUTENE. POLYSORBATE 20. SCLEROTIUM GUM. SORBITAN ISOSTEARATE.

GELIO SUDĖTIS: WATER (AQUA). CETEARETH-60 MYRISTYL GLYCOL. COCO-GLUCOSIDE. ZINC COCETH SULFATE. SODIUM COCOAMPHOACETATE. POLYSORBATE 20. GLYCERIN. CITRIC ACID. ASCORBYL PALMITATE. DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE. GLYCERYL OLEATE. HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE. ISOLEUCINE. LAURETH-3. LECITHIN. MALEIC ACID. SODIUM BENZOATE. SODIUM CHLORIDE. SODIUM HYDROXIDE. TOCOPHEROL.

KREMO SUDĖTIS: WATER (AQUA). GLYCERIN. MINERAL OIL (PARAFFIN LIQUIDUM). GLYCERYL STEARATE. PEG-12. BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER). MICROCRYSTALLINE WAX (CERA MICROCRISTALLINA). CYCLOPENTASILOXANE. PALMITIC ACID. STEARIC ACID. PROPYLENE GLYCOL. 10-HYDROXYDECENOIC ACID. BHT. CHLORPHENESIN. CYCLOHEXASILOXANE. DISODIUM EDTA. O-CYMEN-5-OL. PARAFFIN. PHENOXYETHANOL. TRIETHANOLAMINE.

INFORMACIJA APIE DEXYANE MeD (Medicininė priemonė)

(1) „Dexyane MeD“ informacinis lapelis.

(2) Klinikinis tinkamumo odai ir veiksmingumo tyrimas atliktas derinant su vidutinio stiprumo vietiniais kortikosteroidais ir baigus naudoti priemonę. a) Metodologija: atsiktinių imčių atviras, intraindividualus pranašumo tyrimas; dalyvavo 54 suaugusieji, kuriems atopinė egzema pasireiškia ant rankų ir (arba) pakinkluose (esant vidutinių ir sunkių pažeidimų); 10 dienų po 2 kartus ant vienos galūnės tepta „Dexyane MeD“ kartu su vietiniais kortikosteroidais, o ant kitos tepta tik vietinių kortikosteroidų. Pirminis kriterijus: L-SCORAD pokyčių įvertinimas 1 d. (10,4 be „Dexyane MeD“, 10,2 su „Dexyane MeD“) ir 3 d. (8,9, palyginti su 7,7); b) metodologija: 10 dienų gydymo pabaigoje atliktas ilgalaikis tyrimas, vietinių kortikosteroidų naudojimas nutrauktas, o „Dexyane MeD“ 2 savaites buvo tepamas dukart per dieną tik ant vienos galūnės. Vertinimo kriterijus: pažeidimų atsiradimo įvertinimas 15 d., 6 paūmėjimo atvejai (11,3 %), palyginti su 1 atveju (1,9 %) naudojant „Dexyane MeD“ (t. y. 83 % skirtumas). (RV4421A2013147, 2016-03-04, 91–92, 182–183).

(3) Klinikinis tinkamumo odai ir veiksmingumo tyrimas. Metodologija: atviras tyrimas, kuriame dalyvavo 40 suaugusiųjų, sergančių lėtine rankų egzema (lengvi ar vidutiniai pažeidimai); pažeistos vietos 22 dienas po 2 kartus tepotos „Dexyane MeD“. Pirminis kriterijus: 22 d. tyrėjo įvertintas vietinis tinkamumas (nuo 1 iki 5 balų). Pirminis tinkamumo odai kriterijus: (a) 22 d. tyrėjo įvertintas vietinis tinkamumas (nuo 1 iki 5 balų). Antrinis veiksmingumo kriterijus: (b) 1, 8 ir 22 d. tyrėjo pateiktas veiksmingumo įvertinimas nuo 0 iki 21 balo pagal bendrąjį klinikinio sunkumo rodiklį (mTLSS); (c) paciento nurodytas niežulio stiprumo įvertinimas PGA (nuo 0 iki 10) 1, 8, 15 ir 22 d.; (d) skausmo stiprumo įsivertinimas PGA (nuo 0 iki 10) 1, 8, 15 ir 22 d. Rezultatai: (a) puikus toleravimas 28 (70 %); labai geras – 7 (17,5 %); geras – 5 (12,5 %); (b): modifikuotas bendras pažeidimo simptomų rodiklis (mTLSS) 1 d. – 8,3; 8 d. – 4,4 (–47 %); 22 d. – 3,5 (–58 %); (c) niežulys 1 d. – 5,1; 8 d. – 2,2 (–58 %); 15 d. – 1,5 (–71 %); 22 d. – 1,5 (–70 %); (d) skausmas 1 d. – 4,2; 8 d. – 1,2 (–73 %); 15 d. – 0,8 (–81 %); 22 d. – 0,9 (–78 %) (RV4421A2013149, 2016-02-29; 110–113, 142).

(4) Lyginamasis ex-vivo tyrimas su odos audiniais, 2 valandas laikytais ir apdorotais tirpalu, pagamintu 100 % koncentracijos bandymo metu, palyginti su negydytomis, pažymėtomis odos ląstelėmis, po sąlyčio su auksinio stafilokoko (*Staphylococcus aureus*) suspensija (pritaikyta 1,108 mikroorganizmų/ml), stebima reakcija. Sukibimo slopinimo procentinė dalis apskaičiuojama pagal beta dalelių skaitiklio reaktyvumo lygį po audinių nuplovimo, kad būtų pašalintos neprikibusios bakterijos. (Tyrimas 15-1895, 2015-10-28, 8 psl.).

Privaloma informacija: CE 0459 Ila klasės medicinos prietaisais. Atidžiai perskaitykite informacinį lapelį. Netinka besilaukiančioms ir žindančioms moterims. Netepti ant gleivinės arba kūdikiams sauskėlių dėvėjimo srityje. Vengti patekimo į akis. Tinka naudoti nuo 3 mėnesių. Gamintojas: „Pierre Fabre Medical Devices“.

EGZEMOS SIMPTOMŲ LENGVINIMUI

PAŽEISTAI ODAI

VIDUTINIS AR SUNKUS PAŪMĖJIMAS NAUDOJANT KARTU

VIETINIAI
KORTIKOSTEROIDAI
7–15 dienų,
jei reikia

DEXYANE MeD
dukart per dieną



+

MEDICININĖ
PRIEMONĖ

Padidina vietinių kortikosteroidų
veiksmingumą^(2a)

PALAIKOMAJAM GYDYMUI GALIMA NAUDOTI VIENĄ ARBA KARTU SU KITOMIS PRIEMONĖMIS

VIETINIAI
KORTIKOSTEROIDAI
2–3 kartus per
savaitę, jei reikia

DEXYANE MeD
dukart per dieną



IR
(ARBA)

MEDICININĖ
PRIEMONĖ

Apriboja pakartotinį pažeidimų
atsiradimą⁽¹⁾

ILGALAIKĖ PRIEMONĖ SAUSOMS
ODOS VIETOMS

IŠSKYRUS PAŽEIDIMUS

DEXYANE MINKŠTINAMASIS KREMAS

DERMATOLOGINĖS
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Mažina sausumą ir stiprina odos barjerą



VALYMAS

DEXYANE ITIN SODRUS VALOMASIS GELIS

DERMATOLOGINĖS
KOSMETIKOS PRIEMONĖ



Švelniai
valo

DEXYANE MeD PALPEBRAL

Kremas lengvinantis atopinio ir kontaktinio akių vokų dermatito simptomus

Naujiena



■ Niežulys⁽¹⁾ sumažėjo **-63 %** po pirmo naudojimo

■ Derinant su medikamentiniu gydymu, ženklus pagerėjimas jau po **3 dienų**⁽²⁾

NUO 3 MĖNESIŲ

DEXYANE MeD PALPEBRAL, medicinos priemonė, lengvina atopinio ir kontaktinio dermatito simptomus akių srityje. Itin greitai ir veiksmingai ramina, padeda atkurti normalią odos būklę, apsaugo.

Lengva kremo-gelio konsistencija, intensyviai drėkina, nelipni. Padeda atkurti elastingumą ir komfortą.

Naudojimas:

du kartus per dieną tepkite ant pažeistų akių vokų vietų.


Atsargumo priemonės:

dėl ligos pasitarkite su gydytoju. Nenaudoti nėščioms ir maitinančioms. Stenkitės, kad nepatektų tiesiogiai į akis. Saugokite nuo vaikų.

DEXYANE MeD PALPEBRAL SUDĖTIS

- Drėkinamoji-maitinamoji bazė 51% (glicerinas, taukmedžio sviestas ir trigliceridai)
- Hidroksidecinas
- Natūralus polisacharidinis tinklėlis
- Enoksolonas

Be kvapiklių, kortizono. Atliktas nikelio testas.



Akių vokų atopinis ar kontaktinis dermatitas

WATER (AQUA). GLYCERIN. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. BUTYLENE GLYCOL. POLYSORBATE 60. BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER). PROPYLENE GLYCOL. BEESWAX (CERA ALBA). GLYCERYL STEARATE. PEG-100 STEARATE. 10-HYDROXYDECENOIC ACID. CAPRYLYL GLYCOL. CETYL ALCOHOL. DISODIUM EDTA. GLYCYRRHETINIC ACID. POLYACRYLATE-13. POLYISOBUTENE. POLYSORBATE 20. SCLEROTIUM GUM. SORBITAN ISOSTEARATE. CITRIC ACID.